

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL EN PRATIQUE : MESSAGES CLÉ

ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE :



- En France **2ième cause de décès chez l'homme et 3ième chez la femme**
- Pourtant **taux de participation au dépistage très en dessous de l'objectif** européen minimal acceptable (45%) et en baisse constante depuis 2016-2017 : seulement 26% sur le territoire de la CPTS (Savigny et Morangis 28% / Viry 27% / Juvisy et Paray 25% / Athis 24%) → effort de sensibilisation important à mener

VÉRIFIER LES CRITÈRES D'INCLUSION :



- 50 à 74 ans
- sans symptômes (saignement digestif)
- sans antécédents personnels ou familiaux
- sans coloscopie réalisée <5 ans
- sans coloscanner réalisé < 2 ans

NE JAMAIS :



- remettre un kit <50 ans ou >75 ans
- remettre un nouveau kit pour contrôle immédiat après obtention d'un 1ier test +

ATTENTION AUX DATES :



- Toujours vérifier la **date de péremption** du kit avant remise
- Informer de la nécessité d'**envoyer le test impérativement dans les 24h** qui suivent sa réalisation
- Eviter donc de faire son test un samedi ou veille de jour férié
- Informer de la nécessité de **mentionner impérativement la date de réalisation** sur le tube ET sur la fiche de renseignements

2 SITES À RETENIR :

- www.neonetidf.org : réservé aux **médecins** : en l'absence d'invitation patient : pour **vérifier l'éligibilité et demander l'envoi d'une invitation.** (Pour demander identifiant et mot de passe : contact91@depistage-cancers-idf.fr ou 01.64.90.52.12)
- www.monkit.depistage-colorectal.fr : pour les **patients** : renseigner leur éligibilité et **commander eux-même leur kit** (livraison à domicile)

APRÈS FIT+ / CONSULTATION DE PRÉVENTION :



En cas de FIT+, et de réalisation de coloscopie, selon les résultats le gastro-entérologue planifie le suivi : rythme et modalités selon le niveau de risque (*selon les dernières recommandations 2021 de surveillance post-polypectomie*) :

- **coloscopie à 3 ans**
- **coloscopie à 5 ans**
- **consultation de prévention** : évaluation individuelle et à l'issue reprise des **FIT à 2 ans, ou coloscopie à 7-10 ans**