

# TRAITEMENT DES PNEUMOPATHIES À MYCOPLASMA PNEUMONIAE

## ENFANTS

### 1- CLARITHROMYCINE: 15 MG/KG/J EN 2 PRISES, 5 J

- Suspension buvable 50 mg/ml: pipette graduée selon le poids = 1 dose poids matin et soir
- comprimés à 250 mg et 500 mg
- dose max 1000 mg/j (soit une dose poids 66kg MAX)

### 2- AZITHROMYCINE: 20 MG/KG/J EN UNE SEULE PRISE, 3 J

- Suspension buvable 40 mg/ml: pipette graduée selon le poids = 1 dose poids une fois par jour
- comprimés à 250 mg
- dose max 500 mg/j (soit une dose poids 25kg)

### 3- ROXITHROMYCINE: 5 À 8 MG/KG/J EN 2 PRISES/J, 10 J

- Rulid® 50 mg : comprimés sécables et dispersibles
- 6-11 kg : ½ cp soit 25 mg matin et soir
- 12-23 kg : 1 cp soit 50 mg matin et soir
- 24-40 kg : 2 cp soit 100 mg matin et soir

### 4- ERYTHROMYCINE: 50 MG/KG/J EN 2 PRISES/J, 10 J

- Sachet buvable 125 mg ou 250 mg

## ADULTES

### 1- AZITHROMYCINE

- 500 mg/jour en une prise, 3 à 5 jours

### 2- SPIRAMYCINE (ROVAMYCINE®)

- comprimés à 3 MUI
- 1 comprimé 3 fois par jour, 7 jours

### 3- CLARITHROMYCINE

- 500 mg matin et soir, 7 jours

### 4- DOXYCYCLINE

- 100 mg matin et soir, 7 jours